



## PREPARACIONES PARA RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS

### - RX. COLUMNA LUMBOSACRA.

EL PACIENTE PUEDE ESCOGER UNA DE LAS SIGUIENTES PREPARACIONES:

**OPCIÓN 1:** Dieta líquida el día anterior al examen (jugos sin leche, caldos sin grasas, té, aromáticas). No gaseosas ni tinto. **TRAVAD ORAL** 1 frasco de Travad oral el día anterior a las 8:00 AM y otro a las 8:00 PM. Se diluye el contenido del frasco de Travad en 250 mL de agua o jugo de naranja ingerir la mezcla en dos tomas, con intervalo de 10 minutos.

**Contraindicaciones Travad:** No se debe usar en pacientes que sufran insuficiencia renal grave, ni en pacientes hipertensos. No usar en niños menores de 12 años; ni en pacientes mayores de 65 años. No usar en madres gestantes ni lactantes.

**OPCIÓN 2:** Dieta líquida el día anterior (jugos sin leche, caldos sin grasas, té, aromáticas). No gaseosas ni tinto. **NULYTELY** Dos (2) sobres que se deben diluir cada sobre en un litro de agua tibia mantener refrigerada hasta el momento de la toma.

**Preparación** el día anterior al examen a las 6 PM tomar un vaso de 250 ml cada 10 minutos en ingesta rápida evitando los sorbos, no suspender medicamentos. Para pacientes menores de 12 años NO requiere preparación. Y de 13 años a 17 años se recomienda la toma de Un (1) sobre.

**Advertencias:** No se debe agregar ningún otro tipo de sustancias a la solución. Antes de cada ingesta revolver nuevamente la misma; Una vez preparada la solución debe utilizarse en termino de 48 horas, descártese la porción no usada.

**Contraindicaciones de Nulytely:** No debe ser administrado a pacientes con hipersensibilidad al PEG, obstrucción gastrointestinal, retención gástrica, perforación del intestino, colitis tóxica, megacolon. No usar en niños menores de 12 años, ni en madres gestantes ni lactantes.

### - RX. SACROCOXIS.

EL PACIENTE PUEDE ESCOGER UNA DE LAS SIGUIENTES PREPARACIONES:

**OPCIÓN 1:** Dieta líquida el día anterior al examen (jugos sin leche, caldos sin grasas, té, aromáticas). No gaseosas ni tinto. **TRAVAD ORAL** 1 frasco de Travad oral el día anterior a

las 8:00 AM y otro a las 8:00 PM. Se diluye el contenido del frasco de Travad en 250 mL de agua o jugo de naranja ingerir la mezcla en dos tomas, con intervalo de 10 minutos.

**Contraindicaciones Travad:** No se debe usar en pacientes que sufran insuficiencia renal grave, ni en pacientes hipertensos. No usar en niños menores de 12 años; ni en pacientes mayores de 65 años. No usar en madres gestantes ni lactantes.

**OPCIÓN 2:** Dieta líquida el día anterior (jugos sin leche, caldos sin grasas, té, aromáticas). No gaseosas ni tinto. **NULYTELY** Dos (2) sobres que se deben diluir cada sobre en un litro de agua tibia mantener refrigerada hasta el momento de la toma.

**Preparación** el día anterior al examen a las 6 PM tomar un vaso de 250 ml cada 10 minutos en ingesta rápida evitando los sorbos, no suspender medicamentos. Para pacientes menores de 12 años NO requiere preparación. Y de 13 años a 17 años se recomienda la toma de Un (1) sobre.

**Advertencias:** No se debe agregar ningún otro tipo de sustancias a la solución. Antes de cada ingesta revolver nuevamente la misma; Una vez preparada la solución debe utilizarse en termino de 48 horas, descártese la porción no usada.

**Contraindicaciones de Nulytely:** No debe ser administrado a pacientes con hipersensibilidad al PEG, obstrucción gastrointestinal, retención gástrica, perforación del intestino, colitis tóxica, megacolon. No usar en niños menores de 12 años, ni en madres gestantes ni lactantes.

## - RX. ABDOMEN SIMPLE CON PROYECCIONES ADICIONALES. (Ayuno de 6 horas)

EL PACIENTE PUEDE ESCOGER UNA DE LAS SIGUIENTES PREPARACIONES:

**OPCIÓN 1:** Dieta líquida el día anterior al examen (jugos sin leche, caldos sin grasas, té, aromáticas). No gaseosas ni tinto. **TRAVAD ORAL** 1 frasco de Travad oral el día anterior a las 8:00 AM y otro a las 8:00 PM. Se diluye el contenido del frasco de Travad en 250 mL de agua o jugo de naranja ingerir la mezcla en dos tomas, con intervalo de 10 minutos.

**Contraindicaciones Travad:** No se debe usar en pacientes que sufran insuficiencia renal grave, ni en pacientes hipertensos. No usar en niños menores de 12 años; ni en pacientes mayores de 65 años. No usar en madres gestantes ni lactantes.

**OPCIÓN 2:** Dieta líquida el día anterior (jugos sin leche, caldos sin grasas, té, aromáticas). No gaseosas ni tinto. **NULYTELY** Dos (2) sobres que se deben diluir cada sobre en un litro de agua tibia mantener refrigerada hasta el momento de la toma.



**Preparación** el día anterior al examen a las 6 PM tomar un vaso de 250 ml cada 10 minutos en ingesta rápida evitando los sorbos, no suspender medicamentos. Para pacientes menores de 12 años NO requiere preparación. Y de 13 años a 17 años se recomienda la toma de Un (1) sobre.

**Advertencias:** No se debe agregar ningún otro tipo de sustancias a la solución. Antes de cada ingesta revolver nuevamente la misma; Una vez preparada la solución debe utilizarse en termino de 48 horas, descártese la porción no usada.

**Contraindicaciones de Nulytely:** No debe ser administrado a pacientes con hipersensibilidad al PEG, obstrucción gastrointestinal, retención gástrica, perforación del intestino, colitis tóxica, megacolon. No usar en niños menores de 12 años, ni en madres gestantes ni lactantes.

### - TEST DE ESCOLIOSIS.

EL PACIENTE PUEDE ESCOGER UNA DE LAS SIGUIENTES PREPARACIONES:

**OPCIÓN 1:** Dieta líquida el día anterior al examen (jugos sin leche, caldos sin grasas, té, aromáticas). No gaseosas ni tinto. **TRAVAD ORAL** 1 frasco de Travad oral el día anterior a las 8:00 AM y otro a las 8:00 PM. Se diluye el contenido del frasco de Travad en 250 mL de agua o jugo de naranja ingerir la mezcla en dos tomas, con intervalo de 10 minutos.

**Contraindicaciones Travad:** No se debe usar en pacientes que sufran insuficiencia renal grave, ni en pacientes hipertensos. No usar en niños menores de 12 años; ni en pacientes mayores de 65 años. No usar en madres gestantes ni lactantes.

**OPCIÓN 2:** Dieta líquida el día anterior (jugos sin leche, caldos sin grasas, té, aromáticas). No gaseosas ni tinto. **NULYTELY** Dos (2) sobres que se deben diluir cada sobre en un litro de agua tibia mantener refrigerada hasta el momento de la toma.

**Preparación** el día anterior al examen a las 6 PM tomar un vaso de 250 ml cada 10 minutos en ingesta rápida evitando los sorbos, no suspender medicamentos. Para pacientes menores de 12 años NO requiere preparación. Y de 13 años a 17 años se recomienda la toma de Un (1) sobre.

**Advertencias:** No se debe agregar ningún otro tipo de sustancias a la solución. Antes de cada ingesta revolver nuevamente la misma; Una vez preparada la solución debe utilizarse en termino de 48 horas, descártese la porción no usada.

**Contraindicaciones de Nulytely:** No debe ser administrado a pacientes con



hipersensibilidad al PEG, obstrucción gastrointestinal, retención gástrica, perforación del intestino, colitis tóxica, megacolon. No usar en niños menores de 12 años, ni en madres gestantes ni lactantes.

## PREPARACIONES PARA TOMOGRAFÍA COMPUTADA

### - TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA DE CRÁNEO CON CONTRASTE.

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

1. El día de la cita ayuno de 6 horas.
2. Reporte de creatinina sérica realizada máximo 10 días antes.
3. Suspender la toma de METFORMINA en sus diferentes presentaciones comerciales (Dianben, Galvus Met, Dabex, Dimerfor, Glucophage) 24 horas antes de la fecha y hora del estudio.

### - TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE CRANEO SIMPLE Y CON CONTRASTE.

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

1. El día de la cita ayuno de 6 horas.
2. Reporte de creatinina sérica realizada máximo 10 días antes.
3. Suspender la toma de METFORMINA en sus diferentes presentaciones comerciales (Dianben, Galvus Met, Dabex, Dimerfor, Glucophage) 24 horas antes de la fecha y hora del estudio.

### - TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE CUELLO (TEJIDOS BLANDOS)

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

1. El día de la cita ayuno de 6 horas.
2. Reporte de creatinina sérica realizada máximo 10 días antes.
3. Suspender la toma de METFORMINA en sus diferentes presentaciones comerciales (Dianben, Galvus Met, Dabex, Dimerfor, Glucophage) 24 horas antes de la fecha y hora del estudio.

### **- TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA DE TORAX.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

SI EL ESTUDIO ES SIMPLE: No requiere preparación.

SI EL ESTUDIO ES CONTRASTADO LA PREPARACION ES LA SIGUIENTE.

1. El día de la cita ayuno de 6 horas.
2. Reporte de creatinina sérica realizada máximo 10 días antes.
3. Suspender la toma de METFORMINA en sus diferentes presentaciones comerciales (Dianben, Galvus Met, Dabex, Dimerfor, Glucophage) 24 horas antes de la fecha y hora del estudio.

### **- TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA DE ABDOMEN Y PELVIS (ABDOMEN TOTAL).**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

SI EL ESTUDIO ES SIMPLE: Tomar seis (6) vasos de agua una hora antes del procedimiento.

EL ESTUDIO ES CONTRASTADO LA PREPARACIÓN ES LA SIGUIENTE.

1. Ayuno de 6 horas. Tomar seis (6) vasos de agua una hora antes del procedimiento.
2. Reporte de creatinina sérica realizada máximo 10 días antes.
3. Suspender la toma de METFORMINA en sus diferentes presentaciones comerciales (Dianben, Galvus Met, Dabex, Dimerfor, Glucophage) 24 horas antes de la fecha y hora del estudio.

### **- UROTAC.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Vejiga llena: Tomar 8 vasos de agua empezando dos horas antes de la hora del estudio.

### **- TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTADA DE COLUMNA SEGMENTOS CERVICAL, TORÁCICO, LUMBAR Y/O SACRO.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

SI EL ESTUDIO ES SIMPLE: No requiere preparación.



SI EL ESTUDIO ES CONTRASTADO LA PREPARACIÓN ES LA SIGUIENTE.

1. El día de la cita ayuno de 6 horas.
2. Reporte de creatinina sérica realizada máximo 10 días antes.
3. Suspender la toma de METFORMINA en sus diferentes presentaciones comerciales (Dianben, Galvus Met, Dabex, Dimerfor, Glucophage) 24 horas antes de la fecha y hora del estudio.

### **TOMOGRAFIA DE ARTICULACIONES MIEMBRO SUPERIOR.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

SI EL ESTUDIO ES SIMPLE: No requiere preparación.

SI EL ESTUDIO ES CONTRASTADO LA PREPARACIÓN ES LA SIGUIENTE.

1. El día de la cita ayuno de 6 horas.
2. Reporte de creatinina sérica realizada máximo 10 días antes.
3. Suspender la toma de METFORMINA en sus diferentes presentaciones comerciales (Dianben, Galvus Met, Dabex, Dimerfor, Glucophage) 24 horas antes de la fecha y hora del estudio.

### **TOMOGRFÍA ARTICULACIÓN MIEMBRO INFERIOR.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

SI EL ESTUDIO ES SIMPLE: No requiere preparación.

SI EL ESTUDIO ES CONTRASTADO LA PREPARACIÓN ES LA SIGUIENTE.

1. El día de la cita ayuno de 6 horas.
2. Reporte de creatinina sérica realizada máximo 10 días antes.
3. Suspender la toma de METFORMINA en sus diferentes presentaciones comerciales (Dianben, Galvus Met, Dabex, Dimerfor, Glucophage) 24 horas antes de la fecha y hora del estudio.



## PREPARACIONES PARA ULTRASONOGRAFÍA Y/O ECOGRAFÍA

### **ULTRASONOGRAFÍA DE ABDOMEN TOTAL: HÍGADO, PÁNCREAS, VESÍCULA, VÍAS BILIARES, RIÑONES, BAZO, GRANDES VASOS, PELVIS.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

1. Ayuno de 6 horas.
2. Vejiga llena: Tomar 6 vasos de agua empezando dos horas antes de la hora del estudio.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

### **ULTRASONOGRAFÍA DE ABDOMEN SUPERIOR: HÍGADO, PÁNCREAS, VÍAS BILIARES, RIÑONES, BAZO Y GRANDES VASOS.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

1. Ayuno de 6 horas.
2. Vejiga llena: Tomar 6 vasos de agua empezando dos horas antes de la hora del estudio.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

### **ULTRASONOGRAFÍA DE HÍGADO, PÁNCREAS, VÍA BILIAR Y VÉSICULA.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

1. Ayuno de 6 horas.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

### **ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSABDOMINAL.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Vejiga llena: Tomar 6 vasos de agua empezando dos horas antes de la hora del estudio.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.



### - **ULTRASONOGRAFÍA PELVICA GINECOLOGICA TRANSVAGINAL.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Vejiga llena: Tomar 6 vasos de agua empezando dos horas antes de la hora del estudio.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

### - **ULTRASONOGRAFÍA DE VÍAS URINARIAS (RIÑONES, VEJIGA Y PROSTATA TRANSABDOMINAL).**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Vejiga llena: Tomar 6 vasos de agua empezando dos horas antes de la hora del estudio.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

### - **ULTRASONOGRAFÍA DE RIÑONES, BAZO, AORTA O ADRENALES.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Vejiga llena: Tomar 6 vasos de agua empezando dos horas antes de la hora del estudio.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

### - **ULTRASONOGRAFÍA OBSTETRICA TRANSABDOMINAL.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Vejiga llena: Tomar 6 vasos de agua empezando dos horas antes de la hora del estudio.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

### - **ULTRASONOGRAFÍA DE PRÓSTATA TRAS ABDOMINAL.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Vejiga llena: Tomar 6 vasos de agua empezando dos horas antes de la hora del estudio.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.



## PREPARACIONES PARA ULTRASONOGRAFÍA DOPPLER

### - DUPLEX SCANNING [DOPPLER-ECOGRAFIA] CON EVALUACION DE FLUJO SANGUINEO EN HIPERTENSION PORTAL.

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Ayuno de 12 horas.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

### - DUPLEX SCANNING [DOPPLER-ECOGRAFIA] CON EVALUACION DE FLUJO SANGUINEO EN MASAS PELVICAS.

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Ayuno de 6 horas.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

### - DUPLEX SCANNING [DOPPLER-ECOGRAFIA] DE AORTA ABDOMINAL A COLOR.

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Ayuno de 6 horas.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

### - DUPLEX SCANNING [DOPPLER-ECOGRAFIA] DE ARTERIAS ILIACAS A COLOR.

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Ayuno de 6 horas.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

**- DUPLEX SCANNING [DOPPLER-ECOGRAFIA] DE ARTERIAS MESENERICAS A COLOR.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Ayuno de 6 horas.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

**- DUPLEX SCANNING [DOPPLER-ECOGRAFIA] DE ARTERIAS RENALES A COLOR.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Ayuno de 12 horas.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

**- DUPLEX SCANNING [DOPPLER-ECOGRAFIA] DE TRONCO CELIACO A COLOR.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Ayuno de 6 horas.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

**- DUPLEX SCANNING [DOPPLER-ECOGRAFIA] DE VASOS ABDOMINALES Y/O PELVICOS A COLOR.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Ayuno de 6 horas.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.

**- DUPLEX SCANNING [DOPPLER-ECOGRAFIA] DE VENA CAVA INFERIOR A COLOR.**

TODOS LOS PACIENTES DEBEN TRAER ESTUDIOS PREVIOS.

Ayuno de 6 horas.

NO interrumpir los medicamentos que se encuentre tomando.



## PREPARACIONES PARA COLONOSCOPIAS Y RECTOSIGMOIDOSCOPIAS

Por favor tener en cuentas las siguientes especificaciones para el día del examen

1. Una semana antes del examen evitar consumir granadilla, pitaya o papaya
2. El día anterior al examen solo debe consumir dieta líquida sin lácteos, debe consumir jugos comerciales sin residuo (no debe consumir frutas naturales), debe consumir gelatinas verdes o amarillas (no rojas), puede consumir caldos y consomés sin residuos, té y aromáticas, agua saborizada o Gatorade. No consumir chocolates o café.
3. El día anterior al examen mezclar cuatro sobres de CLEAROVAC x 64g (o POLIETILENGLICOL x 3350, sobre de 106 gr) en dos litros de agua y comenzarla a tomar en forma continua desde las 6:00 p.m. hasta máximo las 11:00 p.m. y acabar los dos litros de la mezcla.
4. Puede tomar la cantidad de agua pura que desee durante la preparación, el día del examen no consumir agua
5. Venir en ayunas
6. Si el paciente debe tomar medicamentos diariamente, lo puede hacer inclusive el día del examen con poca agua
7. El día del examen debe asistir con tiempo, ya que suele durar unos pocos minutos, pero puede prolongarse hasta 30 minutos o más el tiempo de recuperación
8. Asegúrese de venir acompañado, con ropa cómoda y no traer objetos de valor, ni joyas, ni uñas pintadas
9. Si durante la preparación no consumió los dos litros de mezcla o presentó vómitos durante la ingesta, debe reponer o intentar de nuevo la preparación, ya que de eso depende que el examen se puede realizar.
10. Si el paciente tiene colostomía y requiere la colonoscopia, debe avisar para la programación, ya que además debe aplicarse enemas rectales (2) el día del examen.
11. Si el paciente es adulto mayor de 60 años, tiene daño rectal o daño hepático prepararse con IZINOVA.



## KIT DE PREPARACIÓN INTESTINAL

### DOSIFICACIÓN FLEXIBLE

Régimen de dosis divididas (para procedimiento que van a ser realizados en la mañana)

- Primera dosis antes del procedimiento (ejemplo: 2:00 pm – 4:00 pm)
- Segunda dosis 8 – 10 horas después de la primera dosis (10:00 pm – 12:00 am)

Régimen de una dosis (solo si el procedimiento va a ser realizado en horas de la tarde)

- Primera dosis antes del procedimiento (ejemplo: 6:00 am)
- Segunda dosis 2 horas después de la primera dosis (ejemplo: 8:00 am)

En ambos casos: todos los pasos deberán completarse **mínimo 6 horas antes del procedimiento**, para que pueda realizarse bajo sedación.

## PREPARACIÓN PARA ENDOSCOPIAS Y POSTURAS DE BALÓN

1. Venir en ayunas.
2. Si el examen es en la tarde puede consumir en la mañana dieta líquida clara, sin lácteos, debe consumir jugos comerciales sin residuo (no debe consumir frutas naturales), debe consumir gelatinas verdes o amarillas (no rojas), puede consumir caldos y consomés sin residuos, te y aromáticas, agua saborizada o Gatorade. No consumir chocolates o café.