

ANTÍGENO ESPECÍFICO DE PRÓSTATA (PSA)

El antígeno prostático específico (PSA) es una glicoproteína producida exclusivamente por las células de la próstata. Sus niveles pueden aumentar en casos de agrandamiento prostático, tumores, prostatitis, hiperplasia benigna o cáncer de próstata. Incluso después de una prostatectomía radical, el PSA puede seguir siendo detectable.

RECOMENDACIONES:

- NO HABERSE REALIZADO NINGUNA MANIPULACIÓN PROSTÁTICA PREVIA (MASAJE, TACTO RECTAL, BIOPSIA, ECOGRAFIA TRANSRECTAL) LAS ULTIMAS 72 HORAS.
- ABSTINENCIA SEXUAL TRES DÍAS ANTES DEL EXÁMEN.
- NO MONTAR EN MOTO NI CABALLO

¡IMPORTANTE!

Si no puedes asistir a tu cita o necesitas más información, ya sea antes o después de la misma, por favor contáctanos a través de los medios registrados.

PBX: 333 0334367

HORARIOS DE ATENCIÓN TOMA DE MUESTRAS:

Lunes a viernes: 7 – 11am

Sábados: 7 – 9 am

Recuerda que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su médico tratante.