



HEPATITIS C ANTICUERPOS (HCV)

Después de la infección primaria por el virus de la hepatitis C (VHC), los anticuerpos contra el virus (Anti-VHC) son detectables entre las 3 y 9 semanas posteriores, y aproximadamente el 80% de los pacientes infectados son detectados a las 4 semanas. Estos anticuerpos permanecen en el suero del paciente de por vida. La determinación de Anti-VHC generalmente se refiere a los anticuerpos IgG, ya que los anticuerpos IgM no han demostrado ser útiles como marcadores tempranos. Sin embargo, pueden ser útiles como indicadores de recaídas en pacientes trasplantados o con infección crónica. Todos los pacientes con VHC son considerados potencialmente infecciosos.

RECOMENDACIONES:

Ninguna

¡IMPORTANTE!

Si no puedes asistir a tu cita o necesitas más información, ya sea antes o después de la misma, por favor contáctanos a través de los medios registrados.

PBX: 333 0334367

HORARIOS DE ATENCIÓN TOMA DE MUESTRAS:

Lunes a viernes: 7 – 11am

Sábados: 7 – 9 am

Recuerda que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su médico tratante.