



PROTEÍNA C REACTIVA (PCR)

La proteína C reactiva (PCR) es una proteína sintetizada en el hígado y es un reactante de fase aguda, considerado como un marcador de inflamación. Se descubrió inicialmente por su capacidad para precipitar el polisacárido C de neumococos. La PCR activa la vía clásica del complemento en respuesta a la inflamación. Su cuantificación se utiliza con frecuencia para evaluar la actividad de enfermedades inflamatorias y como guía en el tratamiento. Debido a su rápida respuesta, entre 6 y 10 horas después de un evento agudo, la PCR es uno de los marcadores más sensibles de la fase aguda. Se emplea en el diagnóstico de enfermedades infecciosas e inflamatorias como la artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, leucemia, rechazo de trasplantes, manejo de septicemia y meningitis neonatal. También se detecta en pacientes que han recibido transfusiones sanguíneas, han sido sometidos a cirugías o han sufrido quemaduras, pemphigus vulgar y otras lesiones.

RECOMENDACIONES:

Ninguna

¡IMPORTANTE!

Si no puedes asistir a tu cita o necesitas más información, ya sea antes o después de la misma, por favor contáctanos a través de los medios registrados.

PBX: 333 0334367

HORARIOS DE ATENCIÓN TOMA DE MUESTRAS:

Lunes a viernes: 7 – 11am

Sábados: 7 – 9 am

Recuerda que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su médico tratante.