



## PROTEÍNAS TOTALES EN SUERO U OTROS FLUIDOS

Las proteínas plasmáticas actúan como transportadoras y participan en diversas funciones vitales, como formar parte de enzimas, hormonas, anticuerpos y factores de coagulación, además de regular la presión oncótica. La albúmina y la mayoría de las globulinas son producidas en el hígado, mientras que una pequeña cantidad de gammaglobulinas se produce en el sistema retículoendotelial. Las alteraciones en los niveles de proteínas plasmáticas no indican una patología específica, pero reflejan un desequilibrio en los tejidos responsables de la síntesis, catabolismo o pérdida de proteínas. Para interpretar correctamente estas alteraciones, es importante evaluar ambas fracciones proteicas, ya que una disminución en una puede estar oculta por un aumento en la otra.

### RECOMENDACIONES:

Ayuno de 8 a 10 horas.

### ¡IMPORTANTE!

Si no puedes asistir a tu cita o necesitas más información, ya sea antes o después de la misma, por favor contáctanos a través de los medios registrados.

**PBX: 333 0334367**

### HORARIOS DE ATENCIÓN TOMA DE MUESTRAS:

**Lunes a viernes: 7 – 11am**

**Sábados: 7 – 9 am**

***Recuerda que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su médico tratante.***