



## SEROLOGÍA VDRL

Se trata de una enfermedad crónica que se transmite a través del contacto directo, transfusiones sanguíneas o de manera vertical, es decir, de la madre al feto a través de la placenta. La sífilis presenta etapas sintomáticas que se alternan con períodos asintomáticos o de latencia. Durante estos períodos de latencia, la enfermedad solo puede ser detectada mediante pruebas serológicas, lo que permite detener su progreso. Clínicamente, la sífilis se divide en varias fases: incubación, sífilis primaria, secundaria, latente y tardía, con un período de incubación promedio de tres semanas (aunque puede variar de 3 a 90 días). Debido al tipo de antígeno utilizado, algunas pruebas pueden mostrar reacciones positivas en otras condiciones, como colagenopatías, parasitosis, drogadicción, o en situaciones fisiológicas como embarazo o envejecimiento. Las pruebas no treponémicas, como el VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) y el RPR (Rapid Plasma Reagin), tienen alta sensibilidad pero baja especificidad, lo que puede llevar a falsos positivos en estas situaciones.

### RECOMENDACIONES:

Ayudo de 8 a 10 horas

### ¡IMPORTANTE!

Si no puedes asistir a tu cita o necesitas más información, ya sea antes o después de la misma, por favor contáctanos a través de los medios registrados.

**PBX: 333 0334367**

### HORARIOS DE ATENCIÓN TOMA DE MUESTRAS:

**Lunes a viernes: 7 – 11am**

**Sábados: 7 – 9 am**

***Recuerda que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su médico tratante.***