



TIROXINA LIBRE (FT4)

La T4 libre (T4L) es responsable de la actividad biológica de la hormona tiroidea y su concentración sérica está estrechamente relacionada con la secreción y el metabolismo de la T4. Las mediciones de T4L se utilizan para confirmar el diagnóstico y evaluar la gravedad del hipertiroidismo, así como para diagnosticar hipotiroidismo secundario y ajustar el tratamiento con levotiroxina en pacientes con enfermedades hipofisarias. Los niveles de T4L pueden ser el indicador más sensible de la función de la glándula tiroides, especialmente en casos de diagnóstico incierto.

RECOMENDACIONES:

- Ayuno de 8 a 10 horas.
- No tomar medicamento para la tiroides según criterio médico (si no existe ninguna indicación, la dosis se debe ingerir en el horario normal).

¡IMPORTANTE!

Si no puedes asistir a tu cita o necesitas más información, ya sea antes o después de la misma, por favor contáctanos a través de los medios registrados.

PBX: 333 0334367

HORARIOS DE ATENCIÓN TOMA DE MUESTRAS:

Lunes a viernes: 7 – 11am

Sábados: 7 – 9 am

Recuerda que de acuerdo con la ley 100 de 1993 es un DEBER de los pacientes, el autocuidado y adherirse a las recomendaciones de su médico tratante.